

Actiflow B2.0



Concime in sospensione concentrata con Boro e Calcio

Actiflow B2.0 è una sospensione concentrata a base di Boro e Calcio. Grazie alla sua speciale formulazione, garantisce un'ideale traslocazione del Boro e Calcio all'interno della pianta, prevenendo e correggendo le carenze di questi elementi. Applicato in prefioritura, assicura una buona allegagione e un aumento del numero e del peso dei frutticini. Actiflow B2.0 riduce le microfrazioni sui frutti diminuendo le perdite d'acqua e la suscettibilità agli attacchi patogeni. La formulazione Actiflow B2.0 assicura una buona durezza d'azione, solubilità e un rilascio graduale degli elementi. È un prodotto non aggressivo per le foglie anche a concentrazioni elevate. Con la linea Actiflow è possibile coprire le carenze con un solo trattamento per un periodo di 20/30 giorni.



Forma
Liquida



Packaging
Taniche 12x1 L - 2x5 L

COMPOSIZIONE	P/P
Azoto (N) totale	4%
Azoto (N) ureico	4%
Ossido di Calcio (CaO) totale	14%
Boro (B) totale	6,9% (110 g/L)

☐ CONSIGLI DI UTILIZZO:

COLTURA	DOSE	CONCENTRAZIONE MAX	EPOCA	UTILIZZO
Pomacee Drupacee	1-2 L/ha	2%	2 L/ha in pre-fioritura 1 L/ha in post fioritura	Fogliare
Vite da vino Uva da tavola	1-2 L/ha	2%	1 L/ha allo stadio di grappolo visibile 1 L/ha bottoni fiorali separati 1 L/ha in post allegagione	Fogliare
Fragola e piccoli frutti	2-3 L/ha	2%	Dopo il trapianto, in caso di carenze da moderate a gravi. Ripetere il trattamento ogni 10 - 14 giorni fino ad allegagione Non trattare in fioritura	Fogliare
Olivo	2-4 L/ha	2%	2 - 3 interventi da mignolatura a primo ingrossamento della drupa	Fogliare
Colture industriali (barbabietola, colza, girasole)	3 L/ha	2%	2 trattamenti a partire dallo sviluppo fogliare fino a chiusura della fila	Fogliare
Pomodoro da industria	2-3 L/ha	2%	Ad emissione palco fiorale	Fogliare
Leguminose (pisello, fagiolo, erba medica e soia)	3 L/ha	2%	1 - 2 trattamenti: da 5 - 6 foglie alla prefioritura. Non trattare in fioritura	Fogliare
Orticole	10-20 L/ha	0,5 %	1-2 applicazioni a completo sviluppo vegetativo Non trattare in fioritura	Terreno
	3-5 L/ha			Fogliare
Nocciolo	1-2 L/ha	2%	Ripresa vegetativa e post-raccolta	Fogliare

